



**CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE**

CÁMARA DE DIPUTADOS	
DESA DE MOVIMIENTO	
27 SEP 2024	
Recibido.....	07:29.....Hs.
Exp. N°.....	54838.....C.D.

PROYECTO DE COMUNICACIÓN:

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de realizar en todo el territorio provincial, campañas de información y educación sobre cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, en relación al gran aumento de casos de sífilis en la presente.

Lic. Juan Argañaraz
Diputado Provincial

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Los datos difundidos por el último Boletín Epidemiológico Nacional N° 719 (SE 34) de septiembre de 2024, muestra el pico histórico al que la Argentina se enfrenta ante la sífilis, una de las tantas Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que existen. El escenario es cuanto menos preocupante: en el país, en los últimos seis años (período 2018-2023) los casos aumentaron un 42%.

Pero los números reportados que corresponden a nuestra provincia, en ese período histórico, son impactantes: en 2023, Santa Fe quedó como la tercera provincia del país con más casos notificados de esta ITS (4.392), después de Buenos Aires (6.988 infecciones) y Córdoba (6.847 infecciones). Muy por debajo vienen otras jurisdicciones como Entre Ríos, con apenas 300 casos, y CABA, con 552.

No sólo eso: si se toma el número absoluto de casos en 2018 (282) y se lo compara con las infecciones notificadas por las autoridades sanitarias de 2023 (4.392), el incremento porcentual de casos de sífilis en todo el territorio santafesino fue, en sólo seis años, de 1457,4%. En Córdoba, el aumento fue del 363,8%, siempre de 2018 a 2023.

Esta enfermedad, se trata de una infección bacteriana causada por *Treponema pallidum*. Es una infección de transmisión sexual (ITS) que se transmite entre personas por el contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca. También se puede transmitir de la madre al bebé durante el embarazo (sífilis congénita).

Los síntomas varían en las diferentes etapas. Generalmente empiezan 21 días después de la infección, pero pueden aparecer en un plazo de entre 9 y 90 días. La sífilis primaria se manifiesta generalmente por una única úlcera (chancro) en el lugar de la inoculación. Si no se la trata, la enfermedad progresa a la etapa secundaria que puede causar erupciones cutáneas, fiebre y ganglios linfáticos hinchados.


En la etapa latente, que puede durar años, las bacterias continúan estando presentes en el organismo, pero no hay ningún signo ni síntoma. La mayoría de los pacientes continúan en la etapa latente si no reciben tratamiento, pero alrededor de un 25% presentan una sífilis terciaria.

Cómo se previene en la pregunta clave. Simple: con el uso correcto y uniforme de preservativos se reduce significativamente el riesgo de infección. Per para ello es necesario seguir informando y educando.

Por último, el Boletín Epidemiológico hace un llamado de atención: “La sífilis continúa siendo un importante y creciente problema de salud pública. La mejora en la calidad y cobertura de la información constituye una herramienta estratégica para guiar y potenciar acciones para la prevención y control de la sífilis por parte de los diferentes actores involucrados”, concluye.

Es por lo expuesto que solicitamos sean realizadas campañas de información y educación sobre cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, para evitar que esta enfermedad y el resto de las enfermedades de transmisión sexual, sigan esparciéndose y evitar así una crisis en la sociedad y en el sistema de salud.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación de la presente iniciativa.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes. The signature is positioned above a solid horizontal line that spans the width of the signature.

Lic. Juan Argañaraz
Diputado Provincial